


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	FEETS ENEMA		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/7524 /2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 24 Oktober 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Memasukkan suatu enema komersil ke dalam rektum sigmoid melalui anus		
TUJUAN	1. Meningkatkan defekasi dengan menstimulasi peristaltik 2. Mengosongkan usus sebelum menjalani pemeriksaan diagnostik dan pembedahan 3. Memulai program bowel training		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.04/II/0028/2014 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Peralatan 1. Enema komersil 2. Pelumas 3. Pispot atau kamar mandi 4. Sarung tangan bersih 5. Perlak 6. Air dan tisu B. Persiapan 1. Cek rencana tindakan keperawatan dan identifikasi pasien 2. Dekatkan semua peralatan ke dekat pasien 3. Berikan penjelasan tentang tujuan dan tindakan yang akan dilakukan 4. Berikan privasi 5. Cuci tangan 6. Berikan posisi <i>sim</i> (miring) senyaman mungkin tempatkan pengalas di bawah klien C. Prosedur 1. Kenakan sarung tangan bersih 2. Berikan pelumas pada ujung <i>rectal tube</i> 3. Regangkan bokong untuk memasukkan <i>tube</i> ke anus 4. Anjurkan pasien untuk tarik nafas dalam saat memasukkan <i>tube</i> 5. Setelah memasukkan <i>rectal tube</i>, tekan wadah cairan dan masukkan cairan enema komersil sesuai indikasi 7. Anjurkan pasien untuk menahan 5 - 7 menit 8. Letakkan pispot dibawah bokong jika pasien sudah ada sensasi BAB. Bantu pasien ke toilet jika mampu 9. Timbang feses bila diperlukan 10. Bersihkan daerah bokong dengan menggunakan air dan tisu. 11. Angkat pispot dan pengalas. 12. Kenakan pakaian bagian bawah, rapikan tempat tidur. 13. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan 14. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	FEETS ENEMA		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/7524 /2018	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
	Hal yang perlu diperhatikan : 1. Hentikan tindakan apabila terjadi nyeri perut, mual, distensi abdomen dan ada tahanan saat tube dimasukkan 2. Hati-hati pada pasien dengan hemoroid karena beresiko menstimulasi nervus vagal yang menyebabkan <i>cardiac aritmia</i>		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Neurointensif 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Bedah Sentral		