Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMERIKSAAN ANTI HSV-1 IgG

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

OT-02-02/11/1024/2019

2/2

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan reagen Anti HSV-1 IgG, *well* dan peralatan yang akan digunakan.
2. Memipet 100 μ l Calibrator 1, Calibrator 2, Calibrator 3, Positif Kontrol, dan Negatif Kontrol ke dalam masing-masing *well*.
3. Menginkubasi selama 30 menit pada suhu ruang 18-25°C
4. Setelah 30 menit, buang larutan dan mencuci *well* dengan *wash solution* 300 μ l sebanyak 3 kali, kemudian keringkan *well*.
5. Menambahkan 100 μ l *enzyme conjugate* ke semua *well*, lalu diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang 18-25°C
6. Setelah 30 menit, buang larutan dan mencuci *well* dengan *wash solution* 300 μ l sebanyak 3 kali, kemudian keringkan *well*.
7. Menambahkan 100 μ l *substrat solution* ke semua *well*, kemudian diinkubasi 15 menit pada ruang gelap, dengan suhu 18-25°C.
8. Menambahkan 100 μ l *stop solution* ke semua *well*.
9. Membaca *well* pada alat RAYTO RT-6500 dengan panjang gelombang 450-620 nm.

UNIT TERKAIT

Seluruh instalasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMERIKSAAN ANTI HSV-1 IgG		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
SPO	67-02-02/111624/2017 Tanggal Terbit : 6 Maret 2017	Ditetapkan : W' Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemeriksaan Anti HSV-1 IgG adalah pemeriksaan laboratorium kuantitatif untuk mendeteksi infeksi Herpes Simplex Virus tipe 1 (HSV-1) yang terjadi pada masa lampau, namun peningkatan Anti-HSV1 IgG yang signifikan dalam interval waktu tertentu dapat mengindikasikan infeksi HSV1 yang aktif atau baru terjadi.		
TUJUAN	Untuk mendeteksi adanya antibodi IgG HSV-1 di dalam darah. Antibodi IgG merupakan antibodi yang muncul setelah antibodi IgM dan bisa menetap seumur hidup.		
KEBIJAKAN	Instalasi Laboratorium		
PROSEDUR	A. Proses Persiapan 1. Mengeluarkan semua reagen pada suhu ruang 18-25°C sebelum digunakan selama $\pm$ 30 menit. 2. Memeriksa keadaan reagen, jika ada reagen yang mengkristal maka hangatkan reagen pada waterbath dengan suhu 37°C selama 15 menit. 3. Membuat <i>Wash Solution</i> dengan cara <i>Wash Buffer</i> diencerkan 10x dengan Aquadest (1 mL <i>Wash buffer</i> + 9 mL Aquadest), kocok hingga homogen. 4. Persiapan sampel : a. Serum diencerkan dengan perbandingan 1 : 101 dengan menggunakan <i>Sample Buffer</i> (10µl Serum + 1000 µl <i>sample buffer</i>). Inkubasi 10 menit pada suhu ruang.		